

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

OMS

CATEGORÍAS PARA EL INICIO DEL USO DE MAC

- 1- Puede usar el método. Ninguna restricción sobre el uso.**
- 2- Puede usar el método. Las ventajas por lo general exceden los riesgos comprobados o teóricos. Si se dispone de un médico o una enfermera para tomar una decisión clínica, podrían considerarse las condiciones de la categoría 2 al escoger un método. Si el cliente escoge el método podría necesitar más que un seguimiento rutinario.**

CATEGORÍAS PARA EL INICIO DEL USO DE MAC

- 3- **No debe usar** el método a menos que un médico o una enfermera decida clínicamente que el cliente puede usarlo en forma segura. Los riesgos teóricos o comprobados generalmente exceden las ventajas del método. Método de última elección para el cual podría necesitarse un monitoreo regular.
- 4- **No debe usar** el método. La condición/afección representa un **riesgo inaceptable para la salud** si se usa el método.

CRITERIOS MEDICOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL INICIO DEL USO DE DIU CON COBRE

Categoría 1

- Edad \geq 20 años
- Fumadoras
- Obesidad
- Cefaleas (incluidas migrañas)
- Condiciones ginecológicas/obstétricas

Lactancia

Antecedentes de pre-eclampsia

Categoría 1

Antecedentes de embarazo ectópico

Post-parto \geq 4 semanas

Post-aborto, 1er trimestre

Ciclos menstruales irregulares sin
hipermenorrea

Antecedente de enfermedad inflamatoria
pélvica en embarazo anterior

Patología mamaria

Lesión cervical pre-cancerosa

Ectopía cervical

(continuación)

- Condiciones cardiovasculares
 - Trastorno tromboembólico
 - Cardiopatía valvular no complicada
 - Hipertensión
 - Cardiopatía isquémica
- Enfermedades crónicas/Otras condiciones
 - Enfermedad tiroidea
 - Epilepsia
 - Diabetes

(continuación)

- Tumores hepáticos
- Esquistosomiasis (excepto la urinaria con anemia)
- Uso de ciertos ATB y medicamentos anticonvulsivantes
- Patología de la vesícula biliar
- Ictericia (incluso la relacionada con el embarazo)
- Hepatitis (activa o portador)
- Cirrosis (leve o severa)
- Malaria
- TBC no pélvica

Categoría 2

- Edad <20 años
- Condiciones ginecológicas/obstétricas
 - Nuliparidad
 - Ciclos menstruales con hipermenorrea o prolongados o dismenorrea severa
 - Antecedentes de EPI sin embarazo posterior.
 - Anormalidades cervical/uterina (incluido mioma) que no distorsiona cavidad uterina o interfiera con la inserción del DIU
 - Post-parto <48 horas
 - Post-aborto 2do trimestre
- Condiciones cardiovasculares
 - Cardiopatía valvular complicada

Categoría 2

- Enfermedades crónicas/Otras condiciones
Talasemia
Drepanocitosis
Anemia por deficiencia de hierro
- Riesgo de ETS/VIH
Vaginitis sin cervicitis purulenta
- Mujer infectada por VIH (Mirena Categoría 3)
- Mujer expuesta a alto riesgo de VIH
- Mujer afectada por Sida recibiendo tratamiento
ARV

Categoría 3

- Condiciones ginecológicas/obstétricas
Post-parto entre 48 horas y 4 semanas
Enfermedad benigna del trofoblasto
- VIH positivo o SIDA
- Mujeres con Sida clínicamente bien:
no insertar
si pueden continuar uso de Diu previo
- Mujeres infectadas por VIH (Mirena)

Categoría 4

- Condiciones ginecológicas/obstétricas

Embarazo

Sepsis puerperal o aborto séptico

Enfermedad inflamatoria pélvica dentro de los 3 meses

Anormalidades uterinas/cervical incompatibles con la inserción del DIU

Sangrado vaginal inexplicable

Categoría 4

Enfermedad maligna del trofoblasto

Cáncer cervical, endometrial u ovárico

- Enfermedades crónicas/Otras condiciones

TBC pélvica conocida

- Riesgo ETS/VIH

ETS dentro de los 3 meses