

Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI)

EPI es una infección de la parte alta del tracto reproductor femenino

La EPI ocurre mas frecuentemente:

- ▶ Durante el primer mes después de la inserción de un DIU.
- ▶ En mujeres en alto riesgo de contraer ETS

Reducción del riesgo de EPI

- ▶ Identificar a las usuarias con riesgo de ETS
No insertar un DIU si la usuaria corre riesgo alto de contraer ETS (a menos que no haya otros métodos disponibles o que no sean aceptables para la usuaria)
- ▶ Asesorar a usuarias acerca de los factores de riesgo de ETS y EPI
- ▶ Practicar procedimientos de inserción asépticos
- ▶ Efectuar examen de seguimiento dentro de los primeros 30 días a partir de la inserción.

DIU Y EPIA

- **Riesgo de EPIA en Usuarias de DIU:**

1.6 / 1000 mujeres año (O.M.S.)

- **Entonces en 1000 Usuarias de DIU:**

Tendremos: 1 - 2 EPIAS en un año

USUARIAS DE ABORTO

Incidencia de EPIA en abortos inducidos 10 %

En 1000 embarazos no deseados:

Si 100 mujeres se inducen aborto = 10 infecciones

Si 200 “ “ “ “ = 20 “

Si 500 “ “ “ “ = 50 “

Si 800 “ “ “ “ = 80 “

CONCLUSION

1,6 infecciones en 1000 mujeres - año de usuarias DIU

versus

**10 a 80 infecciones en 1000 embarazos no deseados
(según tasa de aborto)**

“Costo” de la acción versus no acción

COBRE T 380 A

- Puede usarse hasta 10 años sin que pierda su eficacia (F.D.A.)
- Tasa acumulativa de fallas: (O.M.S.)

1.4	5	AÑOS
1.6	6	“
1.7	7	“
1.8	8	“
2.1	9	“
2.6	10	“