

Santé sexuelle et reproductive des femmes laotiennes

**Dr Blaise Bourrit
GFMER, Genève**

28.1.2009

Etude FNUAP

Rapportée dans « le rénovateur »
du 28 juillet 2008

Laos

- 6.000.000 habitants
- 75% moins de 25 ans
- 54% moins de 20 ans

Constat

- Education sexuelle quasi inexistante
- Tabou pour parents et enseignants
- Centre de santé reproductive : un au quartier Sihom de Vientiane
- Centre anti-SIDA: un à Savannakhet

Résultats de l'étude

- 15% des naissances chez adolescentes de 15 à 19 ans
- Dont 35% de grossesses non désirées

Etude à Vientiane

- 26% des jeunes femmes ont eu des rapports sexuels avant le mariage
- 23% d'entre elles ont pratiqué une IVG

Etude à Vientiane (suite)

- 12% des adolescents de moins de 15 ans ont déjà eu une relation sexuelle
- 92% des adolescents (non mariés) de 21 ans ont déjà eu des rapports sexuels
- La plupart d'entre eux ont eu des partenaires occasionnelles (souvent prostituées)

Conclusion

Les jeunes filles sont défavorisées par rapport aux hommes

- Moins d'accès à l'information
- Pas en position d'exiger le préservatif ou de refuser (souvent homme plus âgé et expérimenté)

Conclusion 2

- Les adolescents ont des relations précoces et multiples
- Par tradition, ils ont un comportement macho
- Même s'ils connaissent l'usage du préservatif, ils ne se font pas une règle de l'utiliser pour autant

Conclusion 3

- Il faut donc développer et multiplier les centres de planning familial pour conseiller les jeunes filles et apprendre aux garçons à respecter les filles
- Il faut généraliser l'utilisation du préservatif comme moyen de lutte contre le **SIDA**, les **IST**(14% chez les jeunes filles interrogées) et les **grossesses non planifiées**

Recours à l'avortement provoqué

Enquête qualitative effectuée par entretiens
en salle d'attente, à l'hôpital mère-enfant
de Vientiane

Enquête socio-démographique quantitative
longitudinale par l'Institut de Recherche
pour le Développement (IRD), Vientiane

Enquête de Valentine Becquet,

université Paris Sorbonne – René Descartes, juin 2008

Échantillon de l'enquête qualitative

- 10 entretiens avec des femmes ayant eu recours à l'avortement au moins une fois
- 3 entretiens avec des infirmières travaillant à l'hôpital mère-enfant

Échantillon de l'enquête IRD

- 6212 individus, pour un total de 987 ménages
- 1907 femmes, dont 1067 ont déjà été enceintes
- 283 femmes ayant avorté au moins une fois, pour un total de 479 avortements

Résultats

- 26,8% des femmes de 15 à 49 ans ayant déjà été enceintes, ont avorté au moins une fois (N =1067)
- Nombre moyen d'avortements par femme: 1,7
- Certaines femmes ont subi jusqu'à 10 avortements

Résultats secondaires

- Plus les femmes sont pauvres, plus elles ont tendance à avorter
- Les adolescentes ont une forte tendance à avorter (Pas encore mariées; pas encore fini les études)
- Les femmes proches de la ménopause constituent le second groupe à risque (considèrent avoir déjà trop d'enfants)
- Plus le rang de grossesse est élevé, plus la probabilité d'un avortement provoqué augmente

Méthodes d'avortement

- 53% ont avorté par aspiration
- 24,5% par curetage
- 22,5% par méthode médicamenteuse
- Dont 18% par la **pilule chinoise (PGF1)**

NB:biais:les femmes interrogées consultaient pour complications de l'avortement

Répartition en fonction du lieu

- 27,1% à la maison
- 15,7% à l'hôpital
- 54,7 en clinique
- 2,5% autres

Connaissance de la contraception

- 85% des femmes interrogées connaissent au moins un moyen de contraception
- 43,5% des femmes qui ont déjà avorté utilisaient un moyen contraceptif quand elles sont tombées enceintes
- Mais dans l'enquête qualitative, la majorité ne connaissait pas de moyen contraceptif

Connaissance de la pilule contraceptive

- Celles qui connaissent l'existence de la CO pensent souvent que prendre cette CO de manière prolongée rend stérile
- Celles qui l'ont déjà utilisée oublient très souvent de prendre le comprimé quotidiennement

Conclusion

- L'avortement est utilisé comme moyen de contraception, bien qu'il soit illégal
- Le plan d'espacement des naissances du gouvernement lao, qui rend obligatoire les cours d'éducation sexuelle dans les classes du secondaires n'a pas encore porté ses fruits, pas plus que la gratuité des moyens contraceptifs (CO, IUD, condom, gestagène injectable)

Enquête sur la connaissance, l'attitude et la pratique des femmes en matière de fécondité

Nathalie Daffos

Université Paris Sorbonne-René Descartes

Juin 2008

Méthodologie

- Etude descriptive quantitative
- Entretiens semi-directifs
- Questionnaires ouverts

Thèmes abordés

- Fécondité
- Contraception
- Contrôle des naissances
- Genre

Échantillon

- 100 femmes interrogées aléatoirement parmi les consultantes à l'hôpital mère-enfant, du 9 au 13 juin 2008
- 46% venues en visite prénatale
- 35% consultant le service gynécologique
- 12% consultant le planning familial
- 5% pour dépistage HIV ou IST

Provenance, situation

- 25% venues de province
- 47% mères au foyer
- 98% mariées
- 35% venues seules

Fécondité

78% enceintes lors de l'enquête, dont:

- 18% primipares
- 60% multipares (max 8)

2.1 enfants en moyenne

Contrôle des naissances

- Espacement des naissance: **3,7 ans**
- **35%** ont déjà avorté au moins une fois
- 24% d'avortements provoqués
- 7% de fausses couches
- 3% d'avortements thérapeutiques

Contraception 1

- 56% des femmes ne connaissent pas la contraception
- 63% n'ont jamais utilisé de moyen contraceptif, dont 32% par peur des effets secondaires de la pilule

Contraception 2

- Pour celles qui ont déjà utilisé une contraception (24%: CO, 12% condom, 2% injections), les deux tiers se sont procurées leur contraception dans une pharmacie, un tiers au planning familial

Contraception envisagée au futur

- 41% veulent être conseillée par un médecin au planning
- 14% songent à une stérilisation
- 8% veulent un stérilet

Implication du mari

- 36% ont accompagné leur femme enceinte
- 40% donnent leur accord pour la prise d'une contraception (mais laissent le choix à Mme)
- Les hommes veulent plus d'enfants que les femmes (moyenne presque 3)

Annexe 1

Statistiques de l'hôpital mère-enfant de Vientiane

	2005	2006	2007
Accouchements	3.445	3.392	3.623
Avortements	452	670	685
Consultations pédiatriques	10.254	9.187	11.276
Hospitalisations pédiatriques	976	1.165	1.320

Annexe 2: mortalité maternelle et infantile, quelques comparaisons

Pays	Mortalité Maternelle (100'000 live births-42 days)	Facteur	Mortalité Infantile (1'000 live births 1year)	Facteur
Laos	650		64	
Vietnam	130	5	17	3.8
Thaïlande	44	15	18	3.6
Suisse	7	93	4	16

Annexe 3: mortalité néo-natale

Laos: mortalité néonatale **35 pour mille**,
mortalité infantile **82**

Causes: prématurité 37%, infections 23%,
Asphyxie 21%, tétanos 6%, malformations
4%, diarrhées 3%

Mémoire de master 2007, JFMT, AUF, Uni Dr D. Manivong
Enquête cas-témoins dans 47 villages de la zone suburbaine de
Vientiane, 2002-2007

Comparatif OMS 2006:

Chine 21, Vietnam 15, Cambodge 40,
Thaïlande 13, Birmanie 40, Laos 35