

Contraception: cas particuliers

- [Accident vasculaire cérébral](#)
- [Adolescentes](#)
- Anémie
 - [Anémie ferriprive d'origine inconnue ou liée à une hyperménorrhée idiopathique](#)
 - [Anémie inflammatoire d'origine inconnue](#)
 - [Drépanocytose](#)
 - [Thalassémie](#)
- Cardiopathies
 - [Cardiopathie ischémique](#)
 - [Valvulopathie sans complications](#)
 - [Valvulopathie avec complications](#)
- Céphalées
 - [Céphalées modérées](#)
 - [Céphalées sévères, récurrentes, y compris migraines, sans symptômes neurologiques focaux](#)
 - [Céphalées sévères, récurrentes, y compris migraines, avec symptômes neurologiques focaux](#)
- Diabète
 - [Antécédents de diabète gestationnel](#)
 - [Diabète de type II sans vasculopathie](#)
 - [Diabète de type I sans vasculopathie](#)
 - [Néphropathie / rétinopathie / neuropathie](#)
 - [Autre vasculopathie ou diabète de durée >20 ans](#)
- [Dysménorrhée sévère](#)
- [Endométriose](#)
- [Epilepsie](#)
- [Femmes de 40 ans et plus](#)
- [Hyperlipoprotéïnémies](#)
- Hypertension artérielle
 - [Antécédents d'hypertension artérielle \(à l'exclusion de l'hypertension gravidique\)](#)
 - [Tension artérielle 140-159 / 90-99](#)
 - [Tension artérielle 160-179 / 100-109](#)
 - [Tension artérielle >180 / >110](#)

- Infection pelvienne
 - [Antécédents d'infection pelvienne avec grossesse par la suite](#)
 - [Antécédents d'infection pelvienne sans grossesse par la suite](#)
 - [Infection pelvienne actuelle ou dans les 3 derniers mois](#)
- Insuffisance rénale
 - [Insuffisance rénale chronique](#)
 - [Femme dialysée](#)
 - [Femme greffée rénale](#)
- [Lupus érythémateux disséminé](#)
- Maladies sexuelles transmissibles
 - [Maladie sexuelle transmissible actuelle ou dans les 3 derniers mois \(y compris une cervicite purulente\)](#)
 - [Séropositivité HIV](#)
 - [SIDA](#)
- Maladie trophoblastique
 - [Maladie trophoblastique bénigne](#)
 - [Maladie trophoblastique maligne](#)
- [Malaria](#)
- Mastopathies
 - [Tuméfaction mammaire d'origine inconnue \(avant évaluation\)](#)
 - [Mastopathies bénignes](#)
 - [Antécédents familiaux de cancer du sein](#)
 - [Cancer du sein](#)
 - [Cancer du sein traité sans signes de récurrence depuis 5 ans](#)
- Pathologie hépatobiliaire
 - [Pathologie biliaire symptomatique traitée par cholécystectomie](#)
 - [Pathologie biliaire symptomatique traitée par des médicaments](#)
 - [Pathologie biliaire symptomatique en cours](#)
 - [Pathologie biliaire asymptomatique](#)
 - [Antécédents de cholestase gravidique](#)
 - [Antécédents de cholestase sous contraceptifs oraux](#)
 - [Hépatite virale active](#)
 - [Porteuse d'hépatite virale](#)
 - [Cirrhose légère \(compensée\)](#)
 - [Cirrhose grave \(décompensée\)](#)
 - [Adénome du foie](#)

- [Hépatome malin](#)
 - Pathologie thyroïdienne
 - [Goitre simple](#)
 - [Hyperthyroïdie](#)
 - [Hypothyroïdie](#)
 - Post-abortum
 - [Avortement du premier trimestre](#)
 - [Avortement du deuxième trimestre](#)
 - [Avortement septique](#)
 - Post-partum
 - [<6 semaines avec allaitement](#)
 - [6 semaines à 6 mois, avec allaitement](#)
 - [>6 mois, avec allaitement](#)
 - [<4 semaines sans allaitement](#)
 - [>3 semaines sans allaitement](#)
 - Tabagisme
 - [Fumeuses, 30-35 ans](#)
 - [Fumeuses, >35 ans](#)
 - Thrombo-embolie veineuse profonde / embolie pulmonaire
 - [Antécédents de TVP / embolie pulmonaire](#)
 - [TVP / embolie pulmonaire actuelle](#)
 - [Chirurgie majeure avec immobilisation prolongée](#)
 - [Chirurgie majeure sans immobilisation prolongée](#)
 - [Chirurgie mineure sans immobilisation](#)
 - Thrombose veineuse superficielle
 - [Varices](#)
 - [Thrombophlébite superficielle](#)
 - Tuberculose
 - [Tuberculose extragénitale](#)
 - [Tuberculose génitale](#)
 - [Bibliographie](#)
-

Contraception: cas particuliers**Accident vasculaire cérébral**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	
Microprogestatifs	3	Diminution des HDL.
Progestatifs injectables	3	Diminution des HDL.
Norplant	3	Diminution des HDL.
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	2	Effet hypoestrogénique et diminution des HDL.
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Continence périodique	2	Taux élevé d'échecs.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Adolescentes**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	Souhaitables, en particulier les EP combinés. Contre-indiqués si la croissance n'est pas terminée, en raison de l'accélération de la fermeture des cartilages de conjugaison par les estrogènes.
Microprogestatifs	2	Tolérables.
Progestatifs injectables	2 1	Tolérables. Souhaitables chez les adolescentes avec problèmes de compliance pour la pilule.
Norplant	2	Tolérable.
DIU au cuivre	3	Risque infectieux pelvien.
DIU au LNG	3	Risque infectieux pelvien.
Préservatifs	2 1	Taux élevé d'échecs. Souhaitables en combinaison avec les contraceptifs oraux EP.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Contenance périodique	2	Taux élevé d'échecs.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Anémie ferriprive d'origine inconnue ou liée à une hyperménorrhée idiopathique**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	Utiliser une pilule à climat progestatif.
Microprogestatifs	2	Tolérables.
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	3	Risque d'hémorragie.
DIU au LNG	1	
Préservatifs	2	Tolérables.
Spermicides	2	Tolérables.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Tolérables.
Contenance périodique	2	Tolérable.
Coït interrompu	2	Tolérable.
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Anémie inflammatoire d'origine inconnue**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	Contre-indiqués (risque thromboembolique).
Microprogestatifs	2	Tolérables (surveillance stricte).
Progestatifs injectables	4	Contre-indiqués (risque thromboembolique).
DIU au cuivre	4	Contre-indiqués (risque infectieux).
DIU au LNG	4	Contre-indiqués (risque thromboembolique).
Préservatifs	2	Tolérables.
Spermicides	2	Tolérables.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Tolérables.
Contenance périodique	2	Tolérable.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Drépanocytose

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	3	Risque thromboembolique.
Microprogestatifs	2	Tolérables (surveillance stricte).
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	2	Risque d'hémorragie.
DIU au LNG	1	
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Contenance périodique	2	Taux élevé d'échecs.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Thalassémie

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	2	Risque de développement de troubles métaboliques spécifiques.
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	2	Risque d'hémorragie.
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Cardiopathie ischémique**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	
Microprogestatifs	3 2	Acceptables sauf en cas d'anticoagulation (aggravation du saignement utérin).
Progestatifs injectables	3	Effet hypoestrogénique et diminution des HDL.
Progestatifs normodosés	2	Acceptables: acétate de cyprotérone 50 mg/j. 21 j. sur 28 (+ estrogénothérapie pendant les 10 derniers j.).
DIU au cuivre	4 1	Contre-indiqués en cas de cardiopathie susceptible de se compliquer d'une endocardite infectieuse (persistance d'un canal artériel, communications interventriculaires et toutes les valvulopathies opérées ou non) et en cas de traitement anticoagulant. Souhaitables dans les autres cas.
DIU au LNG	4 2	Effet hypoestrogénique et diminution des HDL. Contre-indiqués en cas de cardiopathie susceptible de se compliquer d'une endocardite infectieuse et en cas de traitement anticoagulant. Acceptables dans les autres cas.
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Contenance périodique	2	Taux élevé d'échecs.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.
Allaitement (LAM)	2	La maladie peut empêcher l'allaitement. Allaitement éventuellement déconseillé à cause de la maladie.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Valvulopathie sans complications

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	2	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers

Valvulopathie avec complications (hypertension pulmonaire, fibrillation auriculaire, antécédents d'endocardite)

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	Risque d'embolie.
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	2	Prophylaxie antibiotique pour la prévention d'une endocardite.
DIU au LNG	2	Prophylaxie antibiotique pour la prévention d'une endocardite.
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs. Risque augmenté d'infection.
Contenance périodique	2	Taux élevé d'échecs.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.
Allaitement (LAM)	2	La maladie peut empêcher l'allaitement. Allaitement éventuellement déconseillé à cause de la maladie ou des médicaments utilisés.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Céphalées modérées

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Céphalées sévères, récurrentes, y compris migraines, sans symptômes neurologiques focaux**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	2	
Microprogestatifs	2	
Progestatifs injectables	2	
Norplant	2	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	2	Risque d'aggravation.
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Continence périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Céphalées sévères, récurrentes, y compris migraines, avec symptômes neurologiques focaux**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	Risque d'accident cérébral.
Microprogestatifs	3	
Progestatifs injectables	3	
Norplant	3	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	2	Risque d'aggravation.
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Continence périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

[Contraception: cas particuliers](#)

Antécédents de diabète gestationnel

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Diabète de type II sans vasculopathie**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	2	Modifications du métabolisme glucidique.
Microprogestatifs	2	Modifications légères du métabolisme glucidique.
Progestatifs injectables	2	Modifications légères du métabolisme glucidique.
Norplant	2	Modifications légères du métabolisme glucidique.
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	2	Modifications potentielles du métabolisme glucidique.
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Diabète de type I sans vasculopathie**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	3 2	Modifications du métabolisme glucidique. Les EP (dosés à 20 ou 30 µg d'EE) peuvent être utilisés si le bilan lipidique est normal (sans hypertriglycémie), si la pression artérielle est normale, s'il n'existe pas de néphropathie, pas de tabagisme, si le diabète n'évolue pas depuis plus de 15 ans.
Microprogestatifs	2	Modifications légères du métabolisme glucidique.
Progestatifs injectables	2	Modifications légères du métabolisme glucidique.
Norplant	2	Modifications légères du métabolisme glucidique.
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	2	Modifications potentielles du métabolisme glucidique.
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Continence périodique	2	Taux élevé d'échecs.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Néphropathie / rétinopathie / neuropathie**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	
Microprogestatifs	2	
Progestatifs injectables	3	Modifications du métabolisme lipidique.
Norplant	2	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	2	Modifications potentielles du métabolisme glucidique.
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Contenance périodique	2	Taux élevé d'échecs.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.
Allaitement (LAM)	1	Allaitement éventuellement déconseillé à cause de la maladie ou des médicaments utilisés.

Méthode

1: Souhaitable

2: Acceptable ou tolérable

3: Contre-indication relative

02.12.02

Dysménorrhée sévère

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	2	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable

2: Acceptable ou tolérable

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Endométriose**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	2	Pilule à climat progestatif: tolérable. Estroprogestatifs séquentiels et combinés à climat estrogénique: contre-indiqués.
Microprogestatifs	2	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	2	Risque d'aggravation de la douleur.
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable

2: Acceptable ou tolérable

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Epilepsie**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	Certains antiépileptiques peuvent diminuer l'efficacité des EP.
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	Allaitement éventuellement déconseillé à cause des médicaments utilisés.

Méthode

1: Souhaitable

2: Acceptable ou tolérable

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Femmes de 40 ans et plus**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	2	Risque cardiovasculaire. Acceptables chez les femmes non-fumeuses en bonne santé. Choix de pilules contenant 35 µg d'EE et un progestatif de la nouvelle génération. Les pilules séquentielles sont contre-indiqués.
Microprogestatifs	2	Tolérables.
Progestatifs injectables	2	Tolérables.
Progestatifs normodosés	2	Acceptables chez les femmes non-fumeuses en bonne santé en cas de pathologie utérine ou mammaire. Du 8e au 25e j. du cycle en cas de cycle de 26 j., ou du 5e au 25e j. en cas de cycle de moins de 26 j. Lynestrénol, noréthistérone ou acétate de noréthistérone 10 mg/j; diacétate d'éthinodiol 4 mg/j.
Norplant	1	
DIU au cuivre	2	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	2	Difficilement utilisables: cycles menstruels souvent irréguliers avant la ménopause.
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Hyperlipoprotéinémies**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	3 2	Dépendant de la gravité de la maladie). Contre-indiqués en cas d'hypercholestérolémies majeures et modérées et d'hypertriglycéridémie de type I et V.
Microprogestatifs	2	
Progestatifs injectables	2	
Norplant	2	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	2	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable

2: Acceptable ou tolérable

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Antécédents d'hypertension artérielle (à l'exclusion de l'hypertension gravidique)**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	3	Evaluation de la cause et du degré de l'hypertension artérielle.
Microprogestatifs	2	
Progestatifs injectables	2	Tolérables (surveillance stricte de la tension artérielle).
Norplant	2	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	2	Tolérables. Surveillance stricte de la tension artérielle, effet possible sur le métabolisme lipidique.
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Antécédents d'infection pelvienne avec grossesse par la suite**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Continence périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Antécédents d'infection pelvienne sans grossesse par la suite**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	2	
DIU au LNG	2	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Continence périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Infection pelvienne actuelle ou dans les 3 derniers mois**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	4	
DIU au LNG	4	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Continence périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Insuffisance rénale chronique**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	
Microprogestatifs	2	Tolérables (surveillance stricte).
Progestatifs injectables	2	Tolérables (surveillance stricte).
Porgestatifs normodosés	2	Acceptables: acétate de cyprotérone 50 mg/j. 21 j. sur 28.
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Contenance périodique	2	Taux élevé d'échecs.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Femme dialysée**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	Troubles métaboliques et tensionnels.
Microprogestatifs	4	Spotting: anémie.
Progestatifs injectables	2	Tolérables (surveillance stricte).
Progestatifs normodosés	2	Acceptables: acétate de cyprotérone 50 mg/j. 21 j. sur 28.
DIU au cuivre	4	Ménométrorragies: anémie.
DIU au LNG	1	
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Contenance périodique	2	Taux élevé d'échecs.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Femme greffée rénale**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	Risque vasculaire.
Microprogestatifs	2	Tolérables.
Progestatifs injectables	2	Tolérables (surveillance stricte).
Progestatifs normodosés	2	Acceptables: acétate de cyprotérone 50 mg/j. 21 j. sur 28.
DIU au cuivre	4	Risque infectieux.
DIU au LNG	4	Risque infectieux.
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Contenance périodique	2	Taux élevé d'échecs.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Lupus érythémateux disséminé**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	Risque vasculaire, en particulier thrombotique, et d'aggravation de la maladie.
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	2	Acceptables.
Progestatifs normodosés	2	Acceptables: acétate de cyprotérone 50 mg/j. du 5e au 25e j. du cycle (ou 21 j. sur 28) ou en continu.
DIU au cuivre	2 4	Contre-indiqués en cas de traitement immunosuppresseur (risque infectieux).
DIU au LNG	2 4	Contre-indiqués en cas de traitement immunosuppresseur (risque infectieux).
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Contenance périodique	2	Taux élevé d'échecs.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Maladie sexuelle transmissible actuelle ou dans les 3 derniers mois**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	4	
DIU au LNG	4	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Continence périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Séropositivité HIV**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	3	Risque d'hémorragie.
DIU au LNG	2	
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Contenance périodique	2	Taux élevé d'échecs.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**SIDA**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	3	Risque élevé de MST et infection pelvienne dû à une réaction immunologique supprimée.
DIU au LNG	3	Risque élevé de MST et infection pelvienne dû à une réaction immunologique supprimée.
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Contenance périodique	2	Taux élevé d'échecs.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.
Allaitement (LAM)	3 2	Allaitement déconseillé si le risque de mortalité infantile provoquée par une maladie infectieuse est bas.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Maladie trophoblastique bénigne

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	3	Risque de perforation.
DIU au LNG	3	Risque de perforation.
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Maladie trophoblastique maligne**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	4	
DIU au LNG	4	
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Contenance périodique	2	Taux élevé d'échecs.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.
Allaitement (LAM)	1	Allaitement éventuellement déconseillé à cause de la maladie ou des médicaments utilisés.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

[Contraception: cas particuliers](#)

Malaria

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Tumeur mammaire d'origine inconnue (avant évaluation)**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	2	
Microprogestatifs	2	
Progestatifs injectables	2	
Norplant	2	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	2	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Mastopathies bénignes

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

[Contraception: cas particuliers](#)

Antécédents familiaux de cancer du sein

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Cancer du sein**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	
Microprogestatifs	4	
Progestatifs injectables	4	
Norplant	4	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	4	
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Contenance périodique	2	Taux élevé d'échecs.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Cancer du sein traité sans signes de récurrence depuis 5 ans**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	3	
Microprogestatifs	3	
Progestatifs injectables	3	
Norplant	3	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	3	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Continence périodique	1	
Coït interrompu	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers

Pathologie biliaire symptomatique traitée par cholécystectomie

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	2	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Continence périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Pathologie biliaire symptomatique traitée par des médicaments**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	3	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Continence périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

[Contraception: cas particuliers](#)

Pathologie biliaire symptomatique en cours

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	3	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Pathologie biliaire asymptomatique**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	2	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Antécédents de cholestase gravidique**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	2	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Antécédents de cholestase sous contraceptifs oraux**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	3	
Microprogestatifs	2	
Progestatifs injectables	2	
Norplant	2	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	2	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Continence périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Hépatite virale active

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	
Microprogestatifs	3	
Progestatifs injectables	3	
Norplant	3	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	3	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	Allaitement éventuellement déconseillé à cause de la maladie ou des médicaments utilisés.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Porteuse d'hépatite virale

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Cirrhose légère (compensée)**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	3	
Microprogestatifs	2	
Progestatifs injectables	2	
Norplant	2	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	2	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Cirrhose grave (décompensée)**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	
Microprogestatifs	3	
Progestatifs injectables	3	
Norplant	3	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	3	
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Contenance périodique	2	Taux élevé d'échecs. Méthode difficilement utilisable en cas de fonction ovarienne anormale.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.
Allaitement (LAM)	1	Allaitement éventuellement déconseillé à cause de la maladie ou des médicaments utilisés.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Adénome du foie

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	
Microprogestatifs	3	
Progestatifs injectables	3	
Norplant	3	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	3	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Hépatome malin

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	
Microprogestatifs	3	
Progestatifs injectables	3	
Norplant	3	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	3	
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Contenance périodique	2	Taux élevé d'échecs.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.
Allaitement (LAM)	1	Allaitement éventuellement déconseillé à cause de la maladie ou des médicaments utilisés.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Goitre simple

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Hyperthyroïdie

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	Méthode difficilement utilisable en cas de fonction ovarienne anormale.
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Hypothyroïdie

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	Méthode difficilement utilisable en cas de fonction ovarienne anormale.
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Avortement du premier trimestre**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	Utilisables immédiatement.
Microprogestatifs	1	Utilisables immédiatement.
Progestatifs injectables	1	Utilisables immédiatement.
Norplant	1	Utilisables immédiatement.
DIU au cuivre	1	La pose immédiate du DIU au décours de l'intervention est acceptable.
DIU au LNG	1	La pose immédiate du DIU au décours de l'intervention est acceptable.
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	Retour de l'ovulation variable dans le post-abortum.
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Avortement du deuxième trimestre**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	Utilisables immédiatement.
Microprogestatifs	1	Utilisables immédiatement.
Progestatifs injectables	1	Utilisables immédiatement.
Norplant	1	Utilisables immédiatement.
DIU au cuivre	2	Risque d'expulsion.
DIU au LNG	2	Risque d'expulsion.
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	Utilisables après 6 semaines.
Contenance périodique	1	Retour de l'ovulation variable dans le post-abortum.
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Avortement septique**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	Utilisables immédiatement.
Microprogestatifs	1	Utilisables immédiatement.
Progestatifs injectables	1	Utilisables immédiatement.
Norplant	1	Utilisables immédiatement.
DIU au cuivre	4	
DIU au LNG	4	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	Retour de l'ovulation variable dans le post-abortum.
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Post-partum: >6 mois, avec allaitement**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	2	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	Méthode difficilement utilisable en cas de fonction ovarienne anormale.
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	4	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

[Contraception: cas particuliers](#)**Post-partum: <4 semaines, sans allaitement**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	3	Risque de thrombose.
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	3 2	<48 heures: cat. 2. 48 à 4 sem.: cat. 3 (risque de perforation).
DIU au LNG	3	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	4	
Contenance périodique	4	
Coït interrompu	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Post-partum: ≥4 semaines, sans allaitement**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	>4 sem.
DIU au LNG	1	>4 sem.
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	4 1	Utilisables après 40 jours ou après involution utérine complète.
Continence périodique	1	Méthode difficilement utilisable en cas de fonction ovarienne anormale.
Coït interrompu	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Fumeuses, 30-35 ans**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	3	Risque cardiovasculaire.
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

[Contraception: cas particuliers](#)**Fumeuses, >35 ans**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	Risque cardiovasculaire.
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Antécédents de TVP / Embolie pulmonaire**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**TVP / Embolie pulmonaire actuelle**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	La maladie peut empêcher l'allaitement. Allaitement éventuellement déconseillé à cause de la maladie ou des médicaments utilisés.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Chirurgie majeure avec immobilisation prolongée**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	4	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	La maladie peut empêcher l'allaitement. Allaitement éventuellement déconseillé à cause de la maladie ou des médicaments utilisés.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

[Contraception: cas particuliers](#)

Chirurgie majeure sans immobilisation prolongée

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	2	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Chirurgie mineure sans immobilisation

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Varices

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Thrombophlébite superficielle

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	2	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	1	
Spermicides	1	
Diaphragmes, capes cerv.	1	
Contenance périodique	1	
Coït interrompu	1	
Allaitement (LAM)	1	

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Tuberculose extragénitale**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	1	
DIU au LNG	1	
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Contenance périodique	2	Taux élevé d'échecs.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.
Allaitement (LAM)	2 3	Risque de transmission de l'infection par contact direct avec la mère.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers**Tuberculose génitale**

Méthodes	Cat.	Remarques
Contraceptifs oraux EP	1	
Microprogestatifs	1	
Progestatifs injectables	1	
Norplant	1	
DIU au cuivre	4	
DIU au LNG	4	
Préservatifs	2	Taux élevé d'échecs.
Spermicides	2	Taux élevé d'échecs.
Diaphragmes, capes cerv.	2	Taux élevé d'échecs.
Contenance périodique	2	Taux élevé d'échecs.
Coït interrompu	2	Taux élevé d'échecs.
Allaitement (LAM)	2 3	Risque de transmission de l'infection par contact direct avec la mère.

Méthode

1: Souhaitable 2: Acceptable ou tolérable 3: Contre-indication relative 4: Contre-indication absolue

02.12.02

Contraception: cas particuliers

Bibliographie

- Campana A, Chardonnens D. La contraception hormonale. Méd et Hyg, 56: 833-838, 1998.
 - Improving access to quality care in family planning. World Health Organization, 1996.
 - La contraception intra-utérine. Organisation Mondiale de la Santé, 1998.
 - Morant J, Ruppanner H. Compendium suisse des médicaments 1998. Bâle: Documed, 1997.
 - Serfaty D. La contraception. Paris: Doin, 1992.
-

02.12.02