


Étude des comportements sexuels à risque chez des patients atteints du SIDA et traités par les ARVs




Présentation : COMPAORE Georges D (Burkina Faso)

Sexual Health Research Geneva 2006

Tuteur : Dr Heli BATHIJA

Bourse : OMS



Introduction


Burkina Faso (A O), 13,5 millions d'habitants

Tx prév VIH/SIDA (15 – 49 ans): 2,7% - 6%

2003 OMS & ONUSIDA besoins TTT à 43 000

Initiative « 3 by 5 » objectifs en 2005: 20 000

Accès accru des malades à la TAR (projet
ESTHER, Projet TAN ALIZ, Fonds Global,
projet Burkinavi etc.)



Justification de l'étude

- **Justification**


- Peu d'études (Afrique & Burkina Faso + + +)
 - Impact TAR sur comportement sexuel ?

- **Hypothèse de recherche**

- La TAR change significativement les comportements sexuels des malades du SIDA.

- Questions de recherche:**

- La mise sous TAR, la baisse charge virale (CV), les croyances sur la TAR & baisse CV conduisent elles à des comportements sexuels à risque ?




Objectifs de l'étude

Objectif Général :

- Contribuer à la connaissance des comportements sexuels des malades SIDA mis sous TAR.

Objectifs Spécifiques :

- Investiguer les comportements sexuels des malades du SIDA mis sous TAR dans une cohorte.
- Formuler des recommandations en matière de prévention en direction des malades du SIDA sous TAR.



Design & Méthodologie


Étude observationnelle longitudinale (méthodes quantitatives & qualitatives) des comportements sexuels pré et post traitement.

Sites d'étude: CHU-YO (Ouaga) & CHU-SS (Bobo Dsso)

Échantillons d'étude :


- Quantitative: 160 patients
- Qualitative: ITWA 20 patients; Inf. Clés : 6

Durée de l'étude : 24 mois




Plan d'analyse

- Description de base de la cohorte en fonction des caractéristiques sociodémographiques, professionnelles et psychologiques.
- Les changements de comportements (nombre de partenaires sexuels, utilisation du préservatif, fréquence des rapports sexuels etc.) analysés par rapport à la mise sous ARVs, la charge virale et les croyances sur la TAR.



Considérations éthiques

- Présentation du projet au comité national d'éthique pour approbation
- Trois (3) consentements requis pour cette étude:
 - Patients (étude quantitative)
 - Patients (interviews approfondies)
 - Informateurs clés



CONCLUSION

Passage à l'échelle de la TAR, le problème du comportement des malades du SIDA sous ARVs va se poser avec acuité.

Etudes menées jusqu'à présent (+ +HSM & CDI) n'ont pas permis de trancher clairement la question de l'impact de la TAR sur les comportements sexuels à risque.

L'Afrique en générale, continent fortement touché par l'épidémie du VIH/SIDA (voie de transmission hétérosexuelle prédominante), le Burkina Faso en particulier peut constituer un terrain de choix pour clarifier davantage cette question de recherche.