




Essais de réduction de la transmission materno-fœtale du VIH

I. HEARD

Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris

Diapositive 1 sur 27

A cascade of interventions





Les recommandations

WHO-UNICEF-UNAIDS-UNFPA

- D) choix du traitement antirétroviral
 - Tous les traitements peuvent être implantés
 - Choix fait en fonction des conditions locales
 - Prise en charge obstétricale
 - Possibilités de counseling
 - Acceptabilité de la prophylaxie
 - Cout des traitements

Essais de réduction de la transmission materno-fœtale du VIH

I. Heard

20/06/01

[Cliquez ici pour démarrer](#)

Table des matières

[Essais de réduction de la transmission materno-fœtale du VIH](#)

[Diapositive PPT](#)

[Les méchanismes et le moment de la transmission](#)

[Les facteurs de risque de contamination](#)

[Les traitements antirétroviraux pour réduire la transmission](#)

[Les traitements antirétroviraux pour réduire la transmission](#)

[Les traitements antirétroviraux pour réduire la transmission](#)

[Diapositive PPT](#)

[Diapositive PPT](#)

[Les traitements antirétroviraux pour réduire la transmission](#)

[Les traitements antirétroviraux pour réduire la transmission](#)

[Les traitements antirétroviraux pour réduire la transmission](#)

[Diapositive PPT](#)

[PACTG 316 Study Design](#)

[Infant Infection Status](#)

[Transmission And Maternal Antenatal Antiretroviral Therapy](#)

Transmission And Maternal Delivery CD4 Cell Count*

Transmission And Mode of Delivery

Selection de mutations de résistance avec la NVP

NVP resistance

Les recommandations WHO-UNICEF-UNAIDS-UNFPA

Les recommandations WHO-UNICEF-UNAIDS-UNFPA

Les recommandations WHO-UNICEF-UNAIDS-UNFPA

Les recommandations WHO-UNICEF-UNAIDS-UNFPA

14.08.2001

Essais de réduction de la transmission materno-fœtale du VIH

I. HEARD

Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris

[Diapositive suivante](#)

[Revenir à la première diapositive](#)

[Afficher la version graphique](#)