A scanning electron micrograph (SEM) of sperm cells. The sperm heads are shown in a light blue color, and the tails are in a darker blue. The background is a complex, textured surface, likely a biological membrane or tissue, rendered in shades of blue and white. The overall image has a scientific and clinical feel.

Implication du Laboratoire dans le Diagnostic d'Infertilité Masculine

Hervé LUCAS, Biologiste, Andrologue

LES CAUSES D'INFERTILITE MASCULINE

Consultation de Stérilité Masculine

Endocrinologue
Urologue
Généticien
Psychiatre-Sexologue
Biologiste PMA
Biologiste hormonologie

LA FECONDABILITE

La Fécondabilité : Probabilité mensuelle de conception (Nale 25%)(Schwarz, 1986).

	Nombre d'années d'essai de conception			
	0	1	2	5
Fécondabilité	25%	12%	7,9%	4%

Prévalence de l'infertilité : Un couple sur 7 consulte pour un problème d'infertilité (Thonneau, 1991).

L'OMS définit le spermé normal selon des critères précis, qui font l'objet d'un consensus mais qui sont basés sur peu d'évidences.

Rappel : Les différentes étapes du processus d'interaction gamétique

D'après P. Wassarman

MP et MAI :

Reconnaissance et fixation I puis II

Base :

Fusion gamétique

Flagelle :

Traversée de la ZP

IMPLICATION DU LABORATOIRE DANS LE DIAGNOSTIC D'UNE INFERTILITE MASCULINE

Bilan biologique « orienté »

Replacer l'interprétation des
analyses dans le contexte clinique.

Une analyse sans interprétation ou
orientation diagnostique n'a que peu
d'intérêt

BILAN ANDROLOGIQUE

Anamnèse de l'homme

• Fertilité personnelle et familiale

Histoire du désir de grossesse
Analyses sperme antérieures
Unions antérieures
ATCD PMA
Consanguinité parentale
Délais à concevoir des parents

• ATCD médicaux

Cryptorchidie (50-90% subfertiles)
MST, Infection génito-urinaire
Maladie génétique
Oreillons (10-30% subfertiles)
Radio-chimiothérapie
HTA, Diabète
Fièvre récente

• ATCD chirurgicaux

Chirurgie abdominale et pelvienne
(lésion sympathique)
Opérations sur les testicules (âge de
la descente chirurgicale)
Cure de hernie (3-17% lésion)
Orchidectomie

• Sexualité

Fréquence des rapports
Erection, Libido
Éjaculation ante-portas
Lubrifiants, spermicides

• Divers

Profession
Toxiques
Médicaments (HTA, diabète,
hyperlipidémie...)
Soins dentaires
Habitudes (sport, chaleur)

Examen Clinique

- Aspect général (phénotype)
- Caractères sexuels
- Palpation abdominale, Pelvienne

Organes génitaux

- Testicules
15-30 ml, fermes
- Epididymes
fins et indolores
- Canaux déférents
agénésie, dysgénésie
- Méat urétral, Gland
emplacement, rougeur, HPV
- Prostate et Vésicules Séminales
souple et indolore, dilatation
- Varicocèle
Grade I, II, ou III
Valsalva, Doppler

Bilans complémentaires

■ Génétique

Chromosome Y, gène CFTR,
conseil génétique

■ Imagerie

Echographie (Prostate-VS et testis)
Radiographie (reins)

■ Bilan Psycho-sexologique

■ Bilan Endocrinien

Axe hypothalamo-hypophyso-
gonadique
Bilan glucidique et lipidique

■ Spermogramme

■ Biochimie du PS

■ Migration dans glaire (TH)

■ Préparation du sperme

■ Spermoculture, PCR Chlam.

■ Sérol. HIV, Hépatites, syphilis

■ Ac anti-spermatozoïdes

■ Bilan hormonal

■ Analyses fonctionnelles

LE SPERMOGRAMME (OMS 1994)

Conditions de réalisation de l'analyse :

- Abstinance sexuelle 48 H 7 days
- Température adaptée 20° C - 40° C
- Collection adaptée
 - réceptacle non toxique
 - masturbation
 - sans préservatif
- Délai d'acheminement vers le laboratoire
≤ 1 heure après l'obtention

LE SPERMOGRAMME (OMS 1994)

- Volume $\geq 2\text{ml}$
- Consistance filance $< 2\text{ cm}$
- pH 7.2 - 7.8
- Viabilité $\geq 75\%$
- Concentration spz $\geq 20 \times 10^6 /\text{ml}$
- Nombre total de spz $\geq 40 \times 10^6 /\text{ml}$

LE SPERMOGRAMME : quelques définitions

- Spermogramme normal Normospermie
- Pas d'éjaculat Aspermie
- Nombre de spz diminué Oligozoospermie
- Nombre de spz $< 1\text{M}/\text{éjac}$ Cryptozoospermie
- Pas de spermatozoïdes Azoospermie
- Mobilité spz diminuée Asthénozoospermie
- Vitalité des spz diminuée Nécrozoospermie
- Morphologie des spz diminuée Tératozoospermie

Concentration spermatique et Fertilité

Rehan et al., 1975 *Fertil. Steril.*, 26: 492

Sperm count (10^6 /ml)	Fertile men (n=1300) (%)
<20	7
20 - 39	16
40 - 59	18
> 60	59

Analyse de la mobilité : OMS 1994

- Mobilité après 60 minutes

- linéaire rapide (a): $\geq 20 \mu\text{m}/\text{sec}$ $\geq 25 \%$
- mobilité progressive (a+b): $b < 20 \mu\text{m}/\text{sec}$ $\geq 50 \%$

- Morphologie $\geq 30 \%$ formes normales
(Kruger $> 14 \%$)

Concentration / Mobilité et Fertilité

Smith et al., 1977 *Fertil. Steril.*, 28: 1314

Motility sperm count	Pregnancy rate (%)
< 5.1	33.3
5.1 - 10	27.8
10 - 20	52.9
20 - 40	57.1
40 - 60	60
60 - 100	62.5

Résultats du Spermogramme et Fertilité

Steinberger et al. 1996 *Reprod. Med.*, New York Raven, 187-197

Morphologie des spermatozoïdes et Fertilité

(Kruger et al., 1988-1998)

Table 6 HZA results according to sperm morphology classification. Normal morphology = >14% normal forms; 'good prognosis' pattern = 5-14% normal forms; 'poor prognosis' pattern ≤4% normal forms (values followed by different letters (a and b) are significantly different - $p < 0.05$).

	Morphology (%)	Concentration (%)	Motility (%)	HZA		H2I	Fertilization rate (%)
				Test	Control		
'Poor' prognosis (≤4% normal forms) (n = 13)	2.0 ± 0.3	38.3 ^a ± 9.8	49.5 ^a ± 5.9	25.8 ^a ± 13.1	68.2 ^a ± 6.8	38.2 ^a ± 9.1	29.0 ^a ± 11.9
'Good' prognosis (5-14% normal forms) (n = 14)	7.0 ± 0.4	115.6 ^b ± 15.2	62.1 ^b ± 4.2	72.5 ^b ± 15.5	82.7 ^a ± 15.8	70.1 ^b ± 9.3	67.0 ^b ± 11.8
Normal morphology (>14% normal forms) (n = 13)	16.3 ± 0.3	89.0 ^b ± 18.5	75.3 ^b ± 4.8	90.2 ^b ± 14.5	78.3 ^a ± 17.2	82.4 ^a ± 6.1	92.0 ^b ± 7.7

TROUBLES DE LA MOBILITÉ

LES DYSKINESIES FLAGELLAIRES

En Microscopie Electronique

BRAS EXTERNES DE DYNÉINE :

SPZ mobiles mais Tests Pénétration dans Glairé Négatif

BRAS INTERNES DE DYNÉINE :

SPZ immobiles. Syndrome Cils Immobiles, Kartagener
(situs inversus, bronchectasie).

TUBULES CENTRAUX :

SPZ immobiles. 9+0 Syndrome (*Neugebauer et al., 1990*)

rôle gènes : dynéines, RFX

Autres anomalies de la mobilité

- Syndromes polymalformatifs des complexes axonémaux et péri-axonémaux, syndrome des flagelles courts.
- Altération secondaire de la mobilité spermatique, rôle des facteurs inflammatoires

ANATOMIE DES VOIES GÉNITO-URINAIRES

Anatomie
des voies
génito-
urinaires
masculines

Spermogramme : OMS 1994

- Leucocytes $\leq 10^6$ /ml
- Mixed antiglobulin Reaction Test (MAR) ≤ 10 %
- Immunobeads test (IgG, IgA) ≤ 20 %

Infertilités masculines auto-immunes

- ANTICORPS ANTI-SPERMATOZOÏDES (ACAS) , IgG ou IgA.
- RUPTURE DE LA BARRIÈRE HÉMATO-TESTICULAIRE.
 - 3-20% DES PATIENTS INFERTILES (*Jones, 1986*).
- LOCALISER LES ACAS SUR LES SPERMATOZOÏDES.
- ACAS ↘ LA MOBILITE SPERMATIQUE
↘ LA PENETRATION DE LA GLAIRE
Perturbent L'INTERACTION GAMETIQUE
- PREPARATION DU SPERME SPECIFIQUE.

Que faire dans les infertilité masculines « immunologiques »

- < 50% des SPZ avec anticorps : chercher d'autres facteurs d'infertilité
- > 50% des SPZ avec anticorps : PMA en fonction du test de migration

> 10^6 SPZ / ml

IAC

< 80 %

FIV

> 10^6 - 5×10^5 SPZ / ml

> 80 %, tête.

FIV

> 80 %, tête et mixte.

ICSI

< 5×10^5 SPZ / ml

ICSI

Aspect du sperme

- Très clair

low sperm count

- Marron

HémospERMIE

A microscopic image of sperm, with a blue box containing text. The sperm are shown in various stages of movement and are highlighted in orange. The background is a textured, blueish-grey surface.

Analyse du sperme: Liquéfaction et Viscosité

- ↑ du temps de liquéfaction
- ↑ viscosité

dysfonction de la prostate

Analyse du sperme : volume

- **Volume bas < 2 ml**
 - collection incomplète
 - agénésie des vésicules séminales
 - obstruction du canal éjaculateur
 - éjaculation rétrograde : récupération du sperme dans les urines
- **Volume augmenté > 6 ml**
 - Abstinence longue
 - varicocèle

Analyse du sperme: le pH

• ↑ pH

- dysfonction prostatique

• ↓ pH

- dysfonction vésiculaire
- agénésie vésiculo-déférentielle
- obstacle du canal éjaculateur
- collection incomplète

Biochimie du plasma séminal : OMS 1994

Vésicules séminales :

- Fructose $\geq 13 \mu\text{mol}$ par éjaculat

Prostate :

- Zinc $\geq 2.4 \mu\text{mol}$ par éjaculat
- Acide citrique $\geq 52 \mu\text{mol}$ par éjaculat
- Phosphatase acide $\geq 200 \mu\text{mol}$ par éjaculat

Epididyme :

- α -glucosidase $\geq 20 \text{ mU}$ par éjaculat

Dysfonction prostatique et analyse du sperme

- Liquéfaction différée ou impossible
- Viscosité augmentée
- pH augmenté
- Marqueurs biochimiques de la prostate diminués dans le plasma séminal

Dysfonction vésiculaire et analyse du sperme

A scanning electron micrograph (SEM) of the prostate gland, showing a complex network of ducts and glands. The ducts are highlighted in a reddish-brown color, while the surrounding tissue is in shades of blue and grey. The image provides a detailed view of the glandular structure, with various sized ducts and lobules visible.

- Volume diminué
- Diminution du fructose
- pH diminué

Infection du tractus génital

SPERMOGRAMME

- Volume ↘ (<2 ml)
- Vitalité ↘ (< 50%)
- Mobilité ↘ ou Asthénozoospermie 2^{aire}
- Leucospermie > 1M/ml
- Flagelles enroulés > 10%
- Biochimie perturbée (Fruct., Zinc, Carn.,
α-Glucosidase)
- Spermoculture positive
- + Contexte Clinique +++
- + Bilan Echographique (dilatation VS, foyer
prostatique, vascularisation)

→ **Infection-Inflammation**

↓
Traitement

DERIVES ACTIFS DE L'OXYGENE (DAO ou ROS)

- Intermédiaires très réactifs (e^-) à durée de vie courte 10^{-10} s. Interfèrent avec Prot, ac. Nucl., lipides et sucres. Modifient leur structure (Halliwell, 1996).
- 72% PATIENTS INFERTILES EN PRODUISENT EN EXCÈS VERSUS 25% DES FERTILES (Ford et al., 1997).

PHYSIOLOGIE

+

CAPACITATION

INTERACTION
GAMÈTIQUE

PATHOLOGIE

INFECTIONS,
INFLAMMATIONS

PRODUCTION DE CYTOKINES
(Interféron gamma, TNF alpha)

↘ mobilité SPZ

↘ pouvoir fusiogène des SPZ
(Berger et al., 1982; Hill et al., 1987, 1989).

Diminution de la
fécondance des SPZ *in vitro*

LE ZINC

Prostatite

↓
↘ Zinc

↓
Instabilité de la chromatine

(Kvist et al., 1987, 1988). (Kvist et Eliason, 1980; Blazak et Overstreet, 1982).

115 hommes infertiles 26% avec chromatine instable, corrélé à la ↘ du Zinc *(Kjellberg et al., 1992).*

↘ chez les fumeurs *(Oldereid et al., 1994).*

Analyse du sperme : l'azoospermie

- **Aspermie**

- émission impossible de cause neurologique
- éjaculation rétrograde complète

- **Volume diminué**

- Agénésie vésiculo-déférentielle bilatérale (CFTR)
- Obstacle du canal éjaculateur

Bilan hormonal masculin

- **FSH, LH :** Fonction hypophysaire
- **Testostérone :** Fonction testiculaire
T/libre
Le matin à jeun
- **Prolactine:** Hommes ayant un trouble de la libido et/ou de l'érection.
Interroger sur les traitements.
- **TSH:** Hypothyroïdisme.
- **Inhibine B ...** Hormone antimulérienne ...

Analyse du sperme : l'azoospermie

- **Volume normal**

- **FSH plasmatique élevée**

- absence de spermatogénèse (Sertoli cell syndrome)

- **FSH plasmatique normale**

- Obstacle post-inflammatoire (infectieux, traumatique)
 - Blocage de la spermatogénèse
 - Syndrome de Young
 - Malunion des *vas deferent* et de l'épididyme

- **FSH plasmatique diminuée**

- hypogonadisme hypogonadotrophique

Diagnostic anatomopathologique des biopsies testiculaires

- Absence complète de cellules de la lignée germinale
- Blocage de la lignée germinale (défaut méiotique)
- Hypospermatogénèse
- Spermatogénèse focale
- Spermatogénèse complète

Sertoli Cell Only Syndrome (SCOS)

Pulpe Normale

100 x

Bilan Génétique et Infertilité

Anomalies géniques

- Gène CFTR
- Chromosome Y

Anomalies de nombre

OAT et Disomie

Shi et Martin *Hum. Reprod.* 2001

- Multicolores sondes 1,12,13,21,X,Y sur 10 000 spermatozoïdes (100 patients) résultats variables selon les séries
- Augmentation significative des non disjonctions pour les chromosomes sexuels en accord avec les données prénatales => nondisjonctions XY 14 fois + que témoins

Aneuploidies et Tératospermie / OAT

Calogero et al. *Hum. Reprod.* 2001

Association entre
aneuploidies et
morphologie

2,08% Térato
1,83% OAT
0,87% contrôles

Autres analyses du sperme

- Tests d'aptitude migratoire, swim-up et dans une glaire
- Test de survie des spermatozoïdes
- Analyse automatisée du mouvement des spermatozoïdes.
- Etude de la fonction acrosomique
- Tests de fixation à la zone pellucide
- Test du hamster
- Qualité nucléaire des spermatozoïdes

LA REACTION ACROSOMIQUE

HA (hyperactivated motility) CORRELATION POSITIVE avec :
Fixation pellucidaire, Induction RA, Hamster test, Pouvoir fécondant *in vitro*.

BILAN MASCULIN MINIMAL

avant PMA

- SPERMOGRAMME, SPERMOCYTOGRAMME
- RECHERCHE d'Anticorps anti-spermatozoïdes
- MIGRATION SPZ DANS LA GLAIRE
- BIOCHIMIE DU PLASMA SEMINAL
- SPERMOCULTURE, PCR Chlamydia Urines
- SEROLOGIES HIV, HCV, HBV

Altération de la fonction sécrétoire hormonale des testicules

Marqueur de la cellule de Sertoli... l'inhibine B

[Inhibine B]

Témoin d'une altération de la fonction testiculaire

Et la sécrétion de Testostérone ?

Variation de la Testostéronémie avec l'âge

% d'hommes concernés par une hypotestostéronémie

.....dans les différentes générations

.....Notion d'hypogonadisme

Symptômes d'hypogonadisme chez l'homme âgé

Diminution de la masse musculaire > 25%

Augmentation de la masse grasse abdominale > 10-15 Kg

Diminution de la masse osseuse - ostéoporose

Diminution exponentielle de l'activité sexuelle avec l'âge

Baisse des fonctions cognitives

Perturbation du sommeil

Anxiété

SHBG - testostérone libre

La SHBG (Sex Hormone Binding Globulin)

Se lie à la testostérone

Sa capacité de liaison augmente avec l'âge

Notion de fraction libre, bioactive....

.....qui diminue encore plus vite que la Testostérone totale

Une autre hormone importante chez l'homme, l'estradiol.....

Ratio Estradiol - Testostérone

E2 plasmatique stable ou augmente avec l'âge

Influence de la masse grasse

Ratio E2 / Testostérone

Induit la synthèse de SHBG par le foie....

.....ce qui diminue la fraction libre de testostérone